

PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVEK V MEDICÍNSKÉ PRAXI

Halicar - léčí alergické a zánětlivé dermatózy

Ekzematická onemocnění kůže jsou neobyčejně častá. Podle odhadu trpí takovouto dermatózou 30-50% všech pacientů, kteří vyhledají lékaře právě kvůli kožnímu onemocnění. Mnoho lidí se tak dostává do situace, kdy je nuceno užívat kortikoidy.

Halicar mast představuje v mnoha případech téměř bezrizikovou léčebnou variantu ke kortikosteroidům. Mast má velmi dobrý efekt u kožních vyrážek po bodnutí hmyzem, při sluneční alergii, stejně tak na alergické i atopické ekzémy, neurodermitidy a další stavy podráždění kůže. Přípravek je volně prodejný v lékárnách a není hrazen zdravotní pojišťovnou.

Mast se nanáší v tenké vrstvě 2 až 3 krát denně (podle potřeby častěji) na postižená místa na pokožce a lehce se vmasíruje. Po zmírnění potíží je možno užívat méně často. Přípravek může být používán i u batolat a dětí.

Halicar žádejte v lékárnách

**Bezpečně
proti
kožním potížím**

- oceníte v každé domácnosti
- bezriziková varianta kortikoidů

Halicar®

Spolehlivý výsledný efekt

- mast na ekzémy
- alergické projevy na kůži
 - sluneční alergii
- po bodnutí hmyzem
- na zánětlivé dermatózy a další kožní vyrážky

Dávkování: 3x denně vtírat do kůže
Před použitím čtěte příbalovou informaci, v případě nežádoucích účinků se poraďte se svým lékařem.

LUPÉNKA POD KONTROLOU

Bezpečně a bez kortikoidů proti lupénce

- psoriasis vulgaris (lupénka) je nezhoubná, genetickou dispozicí podmíněná choroba a po ekzémech druhá nejčastější dermatóza.

Rubisan®

- mast pomáhá při suchých a šupinatých ekzémech
- osvědčila se zejména u lehkých až středně těžkých stavů psoriázy (lupénky)
- chronický vývoj psoriázy je pozitivně ovlivňován
- prodlužuje se období bez potíží



Použití: mast se nanáší 3x denně v tenké vrstvě na postižená místa na kůži a lehce se vmasíruje. Před použitím čtěte příbalové informace, v případě nežádoucích účinků se poraďte se svým lékařem.

PSORIÁZA POD KONTROLOU

Příroda má pomoc na každý neduh. Látka z rostliny Mahonia aquifolium (mahonie cesmí-nolistá) prokazatelně působí na kůži i podkoží postižené psoriázou. Lupénku je třeba ovlivňovat výživou i speciální péčí postižených míst. Tady se jako jedinečná ukázala mast vyrobená z mahonie.

Psoriasis vulgaris (lupénka) je po ekzémech druhá nejčastější dermatóza (postižení kůže). Existuje genetická predispozice ke vzniku tohoto onemocnění vlivem různých vyvolávajících faktorů (infekce, psychická traumata, stres v osobním či profesionálním životě). Mechanismy, které se na jejím vzniku podílejí, jsou velmi komplexní, jak dokazují nedávné studie u některých nemocných s psoriázou, svědčící o četných metabolických anomáliích v procesu růstu a diferenciaci kožních buněk a imunitních poruch, nejen kožních, ale i celkových.

Naštěstí však 90% všech pacientů psoriatiků má lehký až střední stupeň onemocnění. Pro ně by lékaři neměli mít jen kortikoidy.

Bezpečnou variantou nahrazující kortikoidy je mast Rubisan. Má spolehlivé protizánětlivé účinky, zpomaluje růst postižených buněk, vyhlazuje kůži. Mast prodlužuje období bez obtíží.